

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-3-67 623562

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

BULLETIN N° 78 DE MARS 1967

Le 9 mars 1967

AVERTISSEMENT.

ARBRES FRUITIERS

Tavelure du poirier : Les chancres à tavelure sur rameaux ont commencé leurs premières projections de spores (conidies). Des risques d'infection sont possibles lors des prochaines pluies. Il y a lieu d'intervenir sur toutes les variétés ayant atteint le stade C3. Pour ce premier traitement, les produits cupriques sont conseillés : dose maximum 250 g de cuivre métal par hl de bouillie.

Tavelure du pommier : De très nombreuses variétés sont au début du stade C (Golden - Cox's orange) ; seuls les arbres ayant atteint le stade C3 (Boskoop dans certains cas) sont à protéger d'une contamination possible par ascospores.

Observations

Chancre du pommier : Les variétés sensibles au chancre à Nectria doivent recevoir dès maintenant une protection cuprique ou oléocuprique. La lutte contre ce champignon doit se poursuivre toute l'année par curetage des plaies à recouvrir d'une spécialité commerciale prévue pour cet usage.

Anthronome du pommier : Dans les vergers où les attaques de ce charançon sont habituelles, effectuer un premier traitement sur les variétés aux stades B-C (bourgeon légèrement éclaté) à l'aide de :

H.C.H.	: 100 g matière active par hl de bouillie
Lindane	: 12 g matière active par hl
D.D.T.	: 100 g matière active par hl

Oïdium du pommier : Il est rappelé que la lutte contre ce champignon doit être entreprise de bonne heure avant le stade C. Dans les vergers très contaminés l'an passé la cadence de traitement jusqu'à la floraison doit être de moins de 10 jours.

Les soufres mouillables peuvent être utilisés à leur dose maximum sans danger, jusqu'à la floraison ; ils ont une action antitavelure non négligeable.

P/1.89

Chancre bactérien du cerisier : La protection contre le chancre bactérien du cerisier est réalisé par des applications cupriques du stade B au stade C3. Ne pas dépasser ce stade, les cerisiers étant sensibles au cuivre dès l'ouverture des bourgeons, la dose maximum de cuivre métal à utiliser par hl est de 200 g.

Maladies des pochettes sur prunier : Cette maladie nous a été signalée assez fréquemment en 1966. Les arbres encore au stade B (boutons gonflés) peuvent être traités dès maintenant à l'aide d'une bouillie cuprique à 250 g de cuivre par hl.

Anthraxose des saules : Cette maladie s'est fréquemment signalée à l'attention en 1965 et en 1966, en particulier sur les saules pleureurs qui ont perdu une grande partie de leur feuillage en avril.

Supprimer les rameaux porteurs de chancres. Effectuer deux ou trois traitements au zinèbe ou au manèbe, à partir du 10 ou du 15 mars, à quinze ou vingt jours d'intervalle.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

L'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire de REIMS.